

KEYVIBE-006: *Estudio de pembrolizumab/vibostolimab (MK-7684A) en combinación con quimiorradioterapia concurrente seguido de pembrolizumab/vibostolimab versus quimiorradioterapia concurrente seguida de durvalumab en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) en etapa III*

Ramas de Tratamiento:

Rama experimental: Coformulación Pembrolizumab/vibostolimab junto con QMT doble de platinos a elección del investigador y radioterapia concurrente

Rama comparativa: QMT doble de platinos a elección del investigador y radioterapia concurrente, seguido de durvalumab

Criterios de inclusión claves:

- NSCLC en estadio IIIA, IIIB o IIIC (no resecable), primera línea para estadio III
- Enfermedad medible según RECIST v1.1. Con una lesión objetivo y biopsia.
- Función orgánica adecuada (ECOG 0 o 1) dentro de 7 días. Tiene una expectativa de vida > 6 meses.

Criterios de exclusión claves:

- Tumores con elementos de células pequeñas. Los tumores mixtos escamosos/no escamosos son elegibles.
- Radioterapia previa en el tórax (incluyendo esófago, mediastino o para cáncer de mama).
- Cirugía mayor < 4 semanas.
- Terapia previa con G-CSF, GM-CSF o eritropoyetina recombinante < 28 días de primera dosis.
- Enfermedad autoinmune activa con terapia < 2 años o inmunosupresión en los últimos 7 días.
- Antecedentes de neumonitis/enfermedad pulmonar intersticial (no infecciosa) actual o tratada