

## **PACIFIC-8:** *Un estudio global para evaluar los efectos de Durvalumab + Domvanalimab después de la quimiorradiación concurrente (cCRT) en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) en estadio III no resecable*

### **Ramas de Tratamiento:**

Rama A experimental: Durvalumab y Domvanalimab, infusión IV q4w.

Rama B comparativa: Durvalumab + placebo, infusión IV q4w.

### **Criterios de inclusión claves:**

- NSCLC localmente avanzada no resecable (etapa III), en segunda línea tras cCRT.
- Biopsia de tejido tumoral obtenida antes de la cCRT. PD-L1  $\geq 1\%$ . Estado de EGFR y ALK wild type.
- Haber recibido al menos 2 ciclos de cCRT basada en platinos y no deben haber progresado tras cCRT definitiva.
- Haber recibido una dosis total de radiación de 60 Gy  $\pm 10\%$  (54 Gy a 66 Gy) como cCRT, mediante RT modulada por intensidad (preferida) o técnica conformada en 3D.

### **Criterios de exclusión claves:**

- Terapia previa con un agente dirigido a otro receptor de células T estimulador o coinhibidor.
- Terapia previa sistémica antineoplásica < 6 meses o radioterapia < 2 semanas.
- Terapia previa con inhibidores de la topoisomerasa 1 o ADC que lo contengan.
- Enfermedad autoinmune (dentro de 2 años) con tratamiento sistémico con agentes inmunosupresores.