

R/R NHL: *Un estudio de seguridad y eficacia preliminar de CC-99282, solo y en combinación con agentes anti-linfoma en participantes con linfomas no Hodgkin recaídos o refractarios.*

Ramas de Tratamiento:

Rama experimental: dosis fija con CC-99282 más Rituximab.

Rama comparativa: placebo más Rituximab.

Criterios de inclusión claves:

- Paciente mayor a 18 años.
- Linfoma no Hodgkin folicular o linfoma difuso de células grandes de novo (o transformado) recidivantes o refractarios con ≥ 2 líneas de terapia (o una línea previa y no son elegibles para trasplante).
- Biopsia con menos de un año antes del ingreso.
- Rendimiento funcional ECOG ≤ 2 .

Criterios de exclusión claves:

- Expectativa de vida ≤ 2 meses
- Ha recibido tratamiento sistémico anticancerígeno previo (aprobado o en investigación) ≤ 5 vidas medias o 4 semanas antes de comenzar con CC-99282.
- Con tratamiento previo con lenalidomida o pomalidomida, un mes previo al ingreso.
- Está en terapia inmunosupresora sistémica crónica o corticosteroides en los últimos 14 días previos al ingreso o tiene enfermedad injerto-contra-huésped (GVHD) clínicamente significativa
- Ecocardio con FE $< 45\%$ o electrocardiograma con bloqueo completo rama izquierda o bloqueo bifascicular.
- Radioterapia un mes previo al ingreso